

ШКАЛА ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛИ



Попросите пациента отметить на линии точку, которая соответствует интенсивности его боли¹.



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ВЕРСИИ ВАШ:

Оценка интенсивности болевого синдрома проводится путем измерения расстояния (мм) между точкой «боли нет» и отметкой пациента в диапазоне от 0 до 10

- 0 - 4 мм – нет боли;
- 5 - 44 мм – слабая боль;
- 45 - 74 мм – умеренная боль;
- 75 - 100 мм – сильная боль.

ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ:

1. Hawker G. A., Mian S., Kendzerska T., French M. Measures of adult pain: Visual Analog Scale for Pain (VAS Pain), Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), Chronic Pain Grade Scale (CPGS), Short Form-36 Bodily Pain Scale (SF-36 BPS), and Measure of Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP). Arthritis Care Res (Hoboken). 2011;63 Suppl 11:S240-S252. doi:10.1002/acr.20543.

Номер одобрения

ШКАЛА ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛИ



Попросите пациента оценить интенсивность его боли, которую он (она) испытывает в настоящее время, воспользовавшись изображением на картинке¹.



ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ:

1. Hawker G. A., Mian S., Kendzerska T., French M. Measures of adult pain: Visual Analog Scale for Pain (VAS Pain), Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), Chronic Pain Grade Scale (CPGS), Short Form-36 Bodily Pain Scale (SF-36 BPS), and Measure of Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP). Arthritis Care Res (Hoboken). 2011;63 Suppl 11:S240-S252. doi:10.1002/acr.20543.

Номер одобрения